

A 飼料

20kg

# ウインザー

濃縮タイプ

# ウインザーC



## 原材料名

乳酸菌、酵母菌、麹菌、枯草菌、有孢子乳酸菌、グア豆抽出繊維(オリゴマンノ)、コーンスターチ、ブドウ糖

## 含有する飼料添加物

セルラーゼ

## ウインザーの特徴

1. 畜舎・糞尿の悪臭を抑えます。
2. 排泄物の発酵を促進し良質な堆肥を生産します。(硝酸態窒素等の分解)
3. 未消化物質になりやすい繊維質を分解して軟便及び糞の量を軽減します。
4. 腸内有用菌を増殖して、有害菌の定着抑制及び排泄作用があります。
5. 健康維持と生産性の向上に役立ちます。

## セルラーゼ(繊維分解酵素)の特徴

1. 糞の量の軽減
2. 軟便対策

## オリゴマンノの特徴

1. 腸内有用菌の栄養源
2. 腸内有害菌の定着抑制及び排泄


—— 製造販売元 ——



株式会社 養日化学研究所

〒463-0074 名古屋市守山区町北9番25号 TEL 052-791-2084

## ● ● ウインザーの使用法 ● ●



- 飼料添加の場合は0.1%でお使い下さい。  
(飼料1トン当り1kg)
- 堆積発酵の場合は10トン当り5kgを混合し、お使い下さい。

### ⚡ウインザーCの場合⚡

- 0.04%添加(400g)
- 2kg/10トン



- 軟便対策に  
仔牛1日1頭当り12.5g、  
成牛1日1頭当り25g  
を投与して下さい。
- 堆積発酵の場合は10トン当り7.5kgを混合し、お使い下さい。

### ⚡ウインザーCの場合⚡

- 仔牛5g/日/頭
- 成牛10g/日/頭
- 3kg/10トン

## そ の 他 の 使 用 方 法

### 床への散布 (湿り対策)

- ▶ 100坪当りウインザー25kgをお使い下さい。  
その後10日おきに追加散布する。

ウインザーCの場合▶ 10kg

### 貯留槽への投入 (スカム対策)

- ▶ 100m<sup>3</sup>当りウインザー12.5kgをお使い下さい。

ウインザーCの場合▶ 5kg

### 草木の発酵 モミガラ発酵

1. 草木を細かく粉砕する。
2. 粉砕草木(モミガラ)1トンに対して、ウインザー5kgと硫酸20kgを添加し混ぜる。
3. 露天の場合はシートを掛けて発酵させる。

ウインザーCの場合▶ 2kg

#### 使用上の注意

- 厳寒期の堆積発酵の場合はウインザーを2倍量に増やして下さい。
- ウインザーの使用は最低3ヶ月の連続使用をお願い致します。
- 原則として製造後6ヶ月以内にご使用下さい。

#### 保存上の注意

- 湿気に注意して下さい。
- 密閉して冷暗所に保存して下さい。
- 開封後は速やかに使用して下さい。

代理店